



## CIFOPLASTICA A PALLONCINO - BALLONKYPHOPLASTIE BEI OSTEOPOROTISCHEN WIRBELFRAKTUREN

<p>L'intervento di cifoplastica a palloncino è consigliabile per quei pazienti che abbiano riscontrato una frattura vertebrale osteoporotica. Più frequente nelle donne (&gt; 50 anni), si manifesta in assenza di trauma o con un trauma minimo (Es: flessione o torsione) con improvviso dolore alla schiena</p>	<p>Osteoporotische Wirbelkörperbrüche betreffen Frauen häufiger als Männer. Bei Frauen gehören sie zu den häufigsten Knochenbrüchen überhaupt. Sie entstehen meist ohne jegliches Trauma oder durch ein Bagateltrauma (wie ruckartiges Bücken oder Drehen des Rumpfes) und äußern sich in starken Rückenschmerzen.</p>
<p><b>TERAPIA CONSERVATIVA:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- riposo a letto</li> <li>- terapia del dolore con farmaci analgesici anche molto potenti (e spesso senza effetto)</li> <li>- busto rigido (da portare fino a 3 mesi e spesso senza miglioramenti)</li> </ul>	<p><b>NICHTOPERATIVE BEHANDLUNG:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bettruhe</li> <li>- starke Schmerzmittel, meist wirkungslos</li> <li>- Stutzkorsett fuer 2, 3 Monate</li> </ul>
<p><b>VANTAGGI DI UN INTERVENTO DI CIFOPLASTICA A PALLONCINO:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Il paziente dopo l'intervento può alzarsi e non necessita di un busto</li> <li>- Riduzione del dolore &gt; al 90%</li> <li>- Ripristino dell'altezza del corpo vertebrale e della deformità spinale</li> </ul> <p style="text-align: center;">In sostanza: recupero immediato della qualità di vita</p>	<p><b>VORTEILE EINER OPERATIVEN BEHANDLUNG MIT BALLONKYPHOPLASTIE</b></p> <p>Bei der Ballonkyphoplastie wird in Lokalanästhesie und ausgehend von einem Hautschnitt von 0,5 cm der eingebrochene Wirbel mittels Ballon aufgerichtet und der Bruch mit Knochenzement stabilisiert.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Der Patient kann unmittelbar nach der OP aufstehen, er braucht kein Stutzkorsett,</li> <li>- die Schmerzen sind sofort um mehr als 90% vermindert</li> <li>- die Höhe des eingebrochenen Wirbelkörpers wird wieder hergestellt</li> </ul>
<p><b>ALTERNATIVE CHIRURGICHE:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Chirurgia aperta tradizionale: molto più impegnativa per chirurgo e anche per il paziente</li> <li>- Vertebroplastica: meno costosa, ma con un elevato tasso di complicanze</li> </ul>	<p><b>ANDERE CHIRURGISCHE BEHANDLUNGSMOEGlichkeiten</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- offene chirurgische Behandlung: für Patienten und Chirurg viel aufwendiger und belastender</li> <li>- Vertebroplastic: Kostengünstiger, aber mit viel höheren Komplikationsrate</li> </ul>